

MAT-53101 Numeerinen analyysi 2 tentti 3.5.2010

MAT-53107 Numerical Analysis 2 Exam 3.5.2010

Tentissä saa käyttää tavallista tai graafista/ohjemoitavaa laskinta ja yhtä käsinkirjoitettua kaksipuolista A4-paperia muistiinpanoja. Laskuissa välivaiheet on kirjoitettava näkyviin.

You are allowed to use a plain or graphing/programmable calculator and one handwritten two-sided A4 sheet of notes. Show all calculation steps.

1. IEEE-perustarkkuusliukulukujärjestelmän tunnusluvut ovat $(\beta, t, L, U) = (2, 23, -126, 127)$. Mikä on suurin positiivinen normalisoitu liukuluku tässä järjestelmässä? Todista, että jos \bar{x} on lukua $x = 12\pi$ lähin oleva IEEE-perustarkkuusliukuluku, niin $\left| \frac{x - \bar{x}}{x} \right| \leq 2^{-24}$.

The IEEE single precision floating point number system has $(\beta, t, L, U) = (2, 23, -126, 127)$. What is the largest positive normalised finite number in this system? Prove that if \bar{x} is the IEEE single precision number that is closest to $x = 12\pi$, then $\left| \frac{x - \bar{x}}{x} \right| \leq 2^{-24}$.

2. Encken satelliitin radan laskumenetelmä vaatii funktion

$$f(x) = \frac{1 - (1 - 2x)^{-3/2}}{x}$$

evaluoinnin. Etsi sarjaesitys, joka mahdollistaa funktion laskemisen tarkasti pienellä x . Montako termiä osasummasta antaa 4 oikeaa desimaalia, kun $-\frac{1}{100} \leq x \leq \frac{1}{100}$? Vihje: $(1 + z)^p = 1 + pz + \frac{p(p-1)}{2!}z^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}z^3 + \dots$ kun $|z| < 1$.

Encke's method for computing the orbit of a satellite requires the evaluation of the function

$$f(x) = \frac{1 - (1 - 2x)^{-3/2}}{x}$$

Find a series representation that allows the function to be computed accurately for small x . How many terms of the partial sum will give an approximation with 4 correct decimals for $-\frac{1}{100} \leq x \leq \frac{1}{100}$? Hint: $(1 + z)^p = 1 + pz + \frac{p(p-1)}{2!}z^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}z^3 + \dots$ for all $|z| < 1$.

3. Laske monimuuttujaisen Newtonin ja Raphsonin menetelmän kaksi iteraatiota yhtälöryhmän $3x_1^2 = x_2^2$, $4x_1x_2^2 = x_1 + 1$ ratkaisemiseksi lähtien alkuarvosta $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Perform two iterations of the *multivariable* Newton-Raphson method to solve $3x_1^2 = x_2^2$, $4x_1x_2^2 = x_1 + 1$ with initial iterate $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

jatkuu sivun toisella puolella / continued on other side